

**Тести до підсумкового модульного контролю №2
з «Медсестринства в педіатрії» (3-й курс 2024)**

1. Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 2 місяців. Який прийом можна використати для попередження аспірації шлункового вмісту під час виймання зонду?

- a) Перетиснути зонд.
- b) Повернути голову на бік.
- c) Закинути голову назад.
- d) Швидко вийняти зонд.
- e) Повільно виймати зонд.

2. Для визначення добового діурезу у дітей старше одного року використовують формулу:

- a) $600+100x (n-1)$.
- b) $500+100x (n-1)$.
- c) $600-100x (n-1)$.
- d) $400+100x (n-1)$.
- e) $500-100x (n-1)$.

3. У дівчинки 7 років скарги на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці, часте болюче сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 16 в полі зору. Яку патологію нирок можна запідозрити в даному випадку?

- a) Інфекцію сечовивідних шляхів.
- b) Гострий проктит.
- c) Гострий гломерулонефрит.
- d) Гострий вагініт.
- e) Нічний енурез.

4. При проведенні екскреторної урографії контрастна речовина вводиться:

- a) Внутрішньовенно.
- b) Підшкірно.

- c) Сечовий міхур.
- d) Внутрішньом'язово.
- e) Стегнову артерію.

5. Дівчинці 11 років, страждає на ревматизм та знаходиться на стаціонарному лікуванні у дитячій лікарні. Яке дієтичне харчування призначається дитині?

- a) Стіл № 10.
- b) Стіл № 5.
- c) Стіл №7.
- d) Стіл № 9.
- e) Стіл № 11.

6. Дитина 7 місяців відмовляється від овочевого пюре та фруктових соків. Мати стурбована з приводу розвитку анемії у дитини. На який діагностичний критерій повинна звернути увагу медична сестра при здійсненні медсестринського обстеження?

- a) Блідість шкіри та слизових оболонок .
- b) Себорейні лусочки.
- c) Молочний струп.
- d) Кишкові розлади.
- e) Попрілості.

7. Хвора дівчинка 7 років. Скарги на часте болісне сечовипускання. Біль в животі у поперековій ділянці, підвищення t° тіла до $37,7^{\circ}\text{C}$. При огляді: шкіра і слизові оболонки бліді. Сеча каламутна. При мікроскопії осаду сечі: лейкоцити 40-50 в полі зору; протеїнурія. На етапі реалізації медсестринських втручань забезпечення якого дієтичного харчування потребує дитина?

- a) Дієтичного стола № 5.
- b) Дієтичного стола № 7.
- c) Дієтичного стола № 1.
- d) Дієтичного стола № 9.
- e) Дієтичного стола № 10.

8. У дитини 5 міс. на тім'яній ділянці голови з'явилися себорейні лусочки, на шкірі щік явища молочного струпа. При реалізації плану медсестринських втручань медсестра порадить матері:

- a) Змащувати елементи стерильною олією за 30 хв. до гігієнічної ванни.
- b) Включити до раціону дитини ягідні, морквяні, цитрусові соки.
- c) Змащувати лусочки декілька разів на добу діамантовим зеленим.
- d) Давати дитині за призначенням лікаря препарати заліза.
- e) Регулярно проводити дитині масаж, гімнастику.

9. Хвора дитина 12 років скаржиться на підвищення t° тіла до 38°C , біль в колінних суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни.

Об'єктивно виявлено припухлість і різку болючість, гіперемію шкіри колінних та гомілковостопних суглобів. При здійсненні другого етапу медсестринського процесу медсестра виявить, що дані проблеми у пацієнта пов'язані з захворюванням на:

- a) Ревматизм.
- b) Скарлатину.
- c) Лейкоз.
- d) Геморагічний васкуліт.
- e) Гломерулонефрит.

10. Дитині 6 років. Сидить у вимушеному положенні, фіксує плечовий пояс. У неї виражений акроціаноз, сухий кашель, частота дихання 70/хв. При здійсненні I етапу медсестринського процесу медсестра виявить:

- a) Експіраторну задишку.
- b) Серцевий горб, розлитий серцевий поштовх.
- c) Геморагії на шкірі.
- d) Деформацію грудної клітки.
- e) Збільшення аксиллярних лімфатичних вузлів.

11. Мати звернулась до медичної сестри зі скаргами на те, що її 3-х місячний малюк має недостатній зріст. Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці – 52 см. При огляді: дитина млява, сонлива, пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. Яку патологію запідозрить медична сестра?

- a) Гіпотиреоз.
- b) Рахіт .
- c) Гіпертіреоз.
- d) Лімфатико-гіпопластичний діатез.
- e) Хвороба Дауна.

12. Дитина з хворобою Шенляйна-Геноха (геморагічний васкуліт) поступила до гематологічного відділення з абдомінально-шкірним синдромом. Було призначено преднізолон, гепарин. Назвіть спосіб введення гепарину?

- a) Підшкірно.
- b) Внутрішньовенно.
- c) Внутрішньом'язово.
- d) Внутрішкірно.
- e) Парентерально.

13. Хлопчик 12 років скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В загальному аналізі крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

- a) Гострий лейкоз.
- b) Ревматоїдний артрит.
- c) Системний червоний вівчак.
- d) Геморагічний васкуліт.
- e) Туберкульоз.

14. Дитині 10 років, скаржиться на підвищення t тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, порушення загального стану, біль в кістках та суглобах. Під час об'єктивного обстеження виявлено: мигдалики збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, в підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді крапок. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?

- a) Фолікулярна ангіна.
- b) Кір.
- c) Катаральна ангіна.
- d) Скарлатина.
- e) Дифтерія.

15. У хлопчика 6 років з ПВС (тетрада Фалло) розвинувся задухо-ціанотичний напад. Яке положення слід надати дитині для покращення її стану?

- a) Колінно-грудне (навпочіпки).
- b) Лежаче з підвищеним головним кінцем.
- c) Напівсидяче.
- d) Сидяче.

е) Горизонтальне.

16. У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. Що необхідно зробити медичній сестрі у першу чергу?

- а) Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа.
- б) Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем.
- в) Покласти міхур з льодом на потилицю.
- г) На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді .
- е) Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 3% розчином перекису водню.

17. Дівчинка 13 років має обтяжений анамнез з цукрового діабету. Яка з проблем може виникнути у дитини в період переддіабету?

- а) Підвищення цукру в крові після цукрового навантаження.
- б) Поліурія, поліфагія, полідипсія.
- в) Глюкозурія, гіперглікемія натще.
- г) Спрага, сонливість, головний біль, блювання.
- е) Підвищення м'язового тонуусу, загальний тремор, зниження АТ, пітливість.

18. У хлопчика 6-ти років через 2 тижні після щеплення виник геморагічний васкуліт, шкірна форма. Визначте переважну локалізацію висипу в типовому випадку.

- а) На нижніх кінцівках, в ділянках колінних та гомілкових суглобів.
- б) На шкірі тулуба, обличчя.
- в) На слизових оболонках.
- г) На внутрішній поверхні стегон, сідницях.
- е) На внутрішній поверхні стегон, статевих органах, сідницях.

19. Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки (ревматизму) в першу чергу включає:

- а) Санацію хронічних вогнищ стрептококової інфекції.
- б) Застосування продуктів з підвищеним вмістом калію.
- в) Заняття фізичною підготовкою та спортом.
- г) Загартовування організму з використанням повітряних та сонячних ванн.
- е) Призначення курсу вітамінів і мікроелементів.

20. Після переохолодження у дитини 12 років з'явилися часті болісні сечовипускання, біль у попереку, блювання, $t -38,5^{\circ}\text{C}$. Що входить до реалізації плану лікування даного стану?

- a) Застосування уроантисептиків, антибіотиків, фітотерапія; дієта №5.
- b) Застосування діуретиків та вітамінів; дієта №9.
- c) Застосування кортикостероїдів та діуретиків; дієта №10.
- d) Застосування антигістамінних препаратів, кортикостероїдів; дієта №11 .
- e) Застосування фітотерапії; стіл №1.

21. Дитина М., 3 роки, з проявами atopічного дерматиту в анамнезі, захворіла на ГРВІ. Після застосування гірчичного обгортання з лікувальною метою стан дитини погіршився: кашель став частішим, переймоподібним, виникла задишка з утрудненим і подовженим видихом. Визначте тип задишки у дитини.

- a) Експіраторний.
- b) Інспіраторний.
- c) Змішаний.
- d) Дихання Біота.
- e) Дихання Куссмауля.

22. У дитини на момент обстеження є ознаки холециститу. Вкажіть наявну проблему дитини при цій хворобі.

- a) Біль у правій підреберній ділянці.
- b) Біль у лівій підреберній ділянці.
- c) Біль у поперековій ділянці.
- d) Біль у правій здухвинній ділянці.
- e) Біль навколо пупка.

23. Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Медична сестра повинна навчити маму проводити лікувальну ванну. Яку із нижче перерахованих ванн вона обере?

- a) З додаванням морської солі.
- b) З додаванням відвару ромашки.
- c) З додаванням відвару дубової кори.
- d) З додаванням крохмалю.
- e) З додаванням відвару череди.

24. Дитина 8-ми років лікується з приводу гострого гломерулонефриту. У дитини спостерігаються набряки, стійке підвищення артеріального тиску. Який режим відмітить медична сестра при складанні плану догляду за цим хворим?

- a) Суворий ліжковий режим.
- b) Ліжковий режим.
- c) Напівліжковий режим.
- d) Палатний режим.
- e) Загальний режим.

25. Дитині 3,5 місяці призначено проведення очисної клізми. Яку кількість рідини повинна набрати у гумовий балончик медична сестра?

- a) 50 мл.
- b) 10 мл.
- c) 30 мл.
- d) 100 мл.
- e) 150 мл.

26. При проведенні ранкового туалету в лікарняній палаті медична сестра проводила підмивання 2-х річної дівчинки в напрямку від лобка до анального отвору. Якою анатомічною особливістю сечовивідних шляхів можна пояснити дії медсестри?

- a) Сечовий канал короткий та широкий.
- b) Слизова оболонка сечового міхура ніжна і пухка.
- c) Стінка сечоводів атонічна.
- d) М'язові волокна сфінктерів сечоводів недорозвинені.
- e) Еластичні волокна мисок недорозвинені.

27. На профілактичному огляді дитина 9-и місяців. Із анамнезу відомо, що дитина вигодувалась молочними сумішами, які мати постійно замінювала. Із прикормів дитина отримує тільки манну кашу. Яке дослідження треба обов'язково запланувати цій дитині з метою виявлення анемії?

- a) Аналіз крові загальний.
- b) Аналіз сечі загальний.
- c) Копрограму.
- d) Зіскоб на ентеробіоз.

е) Мазок із зів на флору.

28. Дитині 7 років з діагнозом “Гострий гастрит” призначена водно-чайна дієта. Яким розчином треба її проводити?

- а) Регідроном.
- б) В.Фруктовим соком.
- в) С.Солодким газованим напоєм.
- г) D.Смектою.
- е) E.Реосорбілактом.

29. Дитині 12 років з діагнозом “Хронічний гастрит” призначено інструментальне обстеження. До якого обстеження треба готувати цю дитину?

- а) Фіброгастродуоденоскопії.
- б) Дуоденального зондування.
- в) Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини.
- г) Рентгенографії.
- е) Колоноскопії.

30. Під час медичного огляду новонародженого мати поскаржилась на почервоніння сідниць. При огляді медична сестра помітила різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно знаходиться в памперсах”, шкірні складки обробляються присипкою тільки після гігієнічної ванни. Про яке захворювання можна подумати?

- а) Попрілість.
- б) Пітниця.
- в) С.Піодермія.
- г) Фізіологічна еритема.
- е) Токсична еритема.

31. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім’яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- а) Алергічний діатез.
- б) Анемія.

- c) Гіпотрофія.
- d) Рахіт.
- e) Пітниця.

32. У дитини 10-ти років після фізичного навантаження з'явилися загальна слабкість, тремтіння кінцівок, поверхнєве дихання, підсилене потовиділення, відчуття голоду. Із анамнезу відомо, що дитина хворіє на цукровий діабет, отримує ін'єкції інсуліну за індивідуальною схемою. Які першочергові дії медсестри в цьому випадку?

- a) Дати дитині перорально будь-які "швидкі" вуглеводи.
- b) Дати випити води.
- c) Дати понюхати нашатирний спирт.
- d) Провести оксигенотерапію.
- e) Покласти дитину на кушетку.

33. В ізоляторі оздоровчого табору знаходиться дитина 12-и років з діагнозом "Фолікулярна ангіна". Яке обстеження треба провести протягом 72-х годин від встановлення цього діагнозу?

- a) Мазок із зів та носа на бацилу Леффлера.
- b) Мазок із зів на бактеріальну флору і чутливість до антибіотиків.
- c) Змив із носоглотки на наявність вірусів.
- d) Загальний аналіз крові.
- e) Загальний аналіз сечі.

34. Глюкагон вводиться при :

- a) Гіпоглікемічній комі.
- b) Гіперглікемічній комі.
- c) Судомному синдрому.
- d) набряку легень.
- e) Астматичному стані.

35. В гематологічному відділенні на лікуванні знаходиться дитина з діагнозом гемофілія . Яке лікування застосовується в першу чергу ?

- a) Антигемофілійна плазма , антигемофілійний глобулін ,кріопреципитат.
- b) Антибактеріальні препарати.
- c) Вітаміни.
- d) Інсулін.

е) Тавегіл, супрастин.

36. Дитина з вродженою вадою серця знаходиться на лікуванні в кардіологічному центрі. В зв'язку з погіршенням стану здоров'я та появою набряків які першочергові дії медсестри при даній патології?

- а. Проводити підрахунок випитої та виділеної рідини .
- б) Підрахунок ЧСС .
- а. Підрахунок частоти дихання .
- с) Вимірювання температури тіла.
- д) Організація настільних ігор.

37. На огляді у педіатра дитина 1 року . Проводиться медсестринський огляд. Які умови необхідні створити для встановлення типу та частоти дихання ?

- а) Порахувати дихальні рухи за 1 хвилину в стані спокою.
- б) Порахувати дихальні рухи за 30 сек в стані спокою.
- с) Порахувати дихальні рухи за 1 хвилину під час годування.
- д) Порахувати дихальні рухи за 1 хвилину під час гри дитини.
- е) Порахувати дихальні рухи за 15сек.

38. Дитина 10 років. Діагноз» Цукровий діабет. «Призначено введення інсуліну. Які проблеми можуть виникнути у батьків та дитини.

- а) Незнання правил та методики введення інсуліну.
- б) Можливість підвищення температури.
- с) Можливість рорзвитку ядухи.
- д) Неспокійний сон.
- е) Можливість підвищення артеріального тиску.

39. При проведенні обстеження дитини з діагнозом залізодефіцитна анемія виникають проблеми...

- а) Бліда шкіра , слабкість, адинамія, порушення смаку .
- б) Гіперплазія навколонігтьового валику.
- с) нарушение осанки.
- д) Гіпертрофія сосочків язика.
- е) Булімія.

40. Про що повинна повідомити медсестра батьків дитини перед обстеженням на ентеробіоз?

- a) Дитину не підмивати .
- b) Підмити дитну.
- c) За 1 годину до обстеження дати випити дитині 300 мл. води.
- d) Зібрати калові маси з різних ділянок шпателем .
- e) Зібрати сечу на протязі доби.

41. Дитина 3 років має алергію на харчові продукти. Що повинна порекомендувати медсестра батькам для виявлення алергену ?

- a) Ведення харчового щоденника.
- b) Виключення м'ясних продуктів.
- c) Вживання багато води.
- d) Контролювати температуру тіла.
- e) Підмивати дитину .

42. У дитини 9 місяців який лікується на дисбактеріоз здутий живіт , спостерігається бурчання в животі , дитина постійно дригає ніжками . В чому проблема?

- a) Метеоризм.
- b) Гіпертермія.
- c) Ексікоз.
- d) Блювання.
- e) Рідкі калові маси .

43. Лікар призначив курс профілактики рахіту доношеній дитині. Коли медсестра повинна внести в план медсестри давання вітаміну Д ?

- a) На 2,6,10 місяцях.
- b) На 3, 4 місяці.
- c) На 4, 5 місяці.
- d) На 3, 4, 5 місяці.
- e) На 2, 4 місяці .

44. Дитині 12 років. Хворіс на ревматичну лихоманку з проявами гострого ревматичного міокардиту та поліартриту. Для ревматичного поліартриту характерно:

- a) Множинність, симетричність ураження суглобів.
- b) Лейкоцитопенія.
- c) Наявність залишкових деформацій.

- d) Вранішня скутість.
- e) Лимфоцитопенія.

45. Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження апетиту, втомлюваність. В аналізі крові: Нв – 90 г/л Е 3,2 x10¹²/л, к.п. – 0,8 Призначення яких ліків найбільш раціональне:

- a) Препаратів заліза.
- b) Вітаміну А.
- c) Вітаміну Д.
- d) Глюконату кальцію.
- e) Алохолу .

46. Як довго триває диспансерний нагляд за дитиною, що виписана зі стаціонару з діагнозом гострий гломерулонефрит:

- a) Протягом 5 років.
- b) Протягом 3 років.
- c) Залежно від варіанта перебігу гломерулонефриту.
- d) Протягом 1 року.
- e) Диспансеризація не планується.

47. Хлопчик 14 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики виразкової хвороби шлунка є головним:

- a) Фіброгастроуденоскопія.
- b) Фракційне зондування.
- c) Рентгенологічний.
- d) Кopro логічний.
- e) Дуоденальне зондування .

48. Для клінічної картини тромбоцитопенічної пурпури у дітей характерне:

- a) Підшкірні крововиливи, петехіальні висипи на шкірі тулуба.
- b) Симетричність уражень суглобів.
- c) Підвищення артеріального тиску.
- d) Набряки на тулубі.
- e) Молочний струп.

49. У дворічної дитини температура 38оС, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Такі симптоми вказують на:

- a) Гостру пневмонію.
- b) Назофарингіт.
- c) Гострий бронхіт.
- d) Гострий ларингіт.
- e) Бронхіальну астму

50. Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці, що виникає натще, може бути нічним або через дві години після їжі:

- a) Виразкова хвороба.
- b) Гострий гастрит.
- c) Гострий панкреатит.
- d) Холецистит.
- e) Хронічний коліт.

51. До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, нападоподібний настирливий кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно – емфізематозне здуття грудної клітки; аускультативно – різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Ви запідозрили бронхіальну астму. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?

- a) Спірометрія.
- b) Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки.
- c) Загальний аналіз крові.
- d) Бронхоскопія.
- e) Загальний клінічний аналіз мокротиння .

52. У дитини 10-ти років на основі скарг на печію, відрижку кислим, блювання, нудоту, біль натще справа від пупка діагностовано виразкову хворобу 12-типалої кишки. Призначено діету № 1а. Що входить до складу цієї дієти?

- a) Слизисті супи, овочеві відвари, рідке картопляне пюре.
- b) Тефтелі, білі сухарі, парові котлети.
- c) Відварена та печена картопля, білий черствий хліб.

- d) Жирний курячий бульйон, ковбаса.
- e) Консерви, тістечка, кава .

53. У дитини 11-ти років запідозрено ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені додаткові методи обстеження. Ви оцінюєте результати ревмопроб. Який показник підтвердить даний діагноз?

- a) Поява С – реактивного протеїну.
- b) Тромбоцитопенія.
- c) Гіперглікемія.
- d) Гематурія.
- e) Підвищення рівня білірубіну в крові .

54. Який із вказаних симптомів характерний для клінічної картини гострого пієлонефриту у дітей:

- a) Піурія.
- b) Глюкозурія.
- c) Ціаноз шкіри.
- d) Макрогематурія.
- e) Петехіальні висипи на шкірі.

55. У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з товстими губами, збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного захворювання?

- a) Знижена продукція тиреоїдних гормонів щитоподібної залози.
- b) Підвищена продукція тиреоїдних гормонів.
- c) Підвищена функція кори наднирників.
- d) Дефіцит інсуліну.
- e) Знижена функція кори наднирників.

56. Назвіть основний метод лікування залізодефіцитної анемії.

- a) Прийом препаратів заліза.
- b) Вітамінотерапія.
- c) Переливання крові.
- d) Введення плазми.
- e) Гормональна терапія.

57. Гемофілія належить до захворювань:

- a) Спадкових.
- b) Інфекційних.
- c) Алергійних.
- d) Інфекційно – алергійних.
- e) Ендокринних.

58. Яке ефективніше лікування природжених вад серця у дітей на сучасному етапі?

- a) Хірургічне.
- b) Антибіотикотерапія.
- c) Антигістамінні препарати.
- d) Вітамінотерапія.
- e) Пробиотикотерапія .

59. Реабілітація хворого на гостру пневмонію віком 3-х років у поліклініці здійснюється:

- a) Протягом 3 місяців.
- b) Протягом 1 року.
- c) Протягом 1,5 року.
- d) Протягом 4 місяців.
- e) Протягом 5 місяців.

60. Сліпі зондування проводяться при :

- a) Дискінезії жовчних шляхів .
- b) Ревматизмі .
- c) Вроджених вадах серця .
- d) Захворюваннях крові .
- e) Алергічних діатезах .

61. У дитини 12 років спостерігаються: млявість, головний біль, гіркота в роті, відрижка, блідість шкіри, болючість у правому підребер'ї. Медична сестра здійснює підготовку дитини до ультразвукового дослідження органів травлення. Вкажіть препарат, який найдоцільніше дати дитині протягом трьох днів для зменшення метеоризму.

- a) Карболен .
- b) Ентеросептол .

- c) Фталазол .
- d) Левоміцетин .
- e) Бактрим.

62. Хлопчик 5 років перебуває на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні. При обстеженні координації рухів. Вкажіть першочергові дії медсестри.

- a) Забезпечити ліжковий режим .
- b) Застосувати серцеві глікозиди.
- c) Постійно проводити оксигенотерапію.
- d) Визначити властивості пульсу
- e) Призначити збалансоване харчування.

63. У дівчинки 2 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені гострики. Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та медикаментозного лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань вкажіть контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини.

- a) Зіскоб на ентеробіоз.
- b) Загальний аналіз крові.
- c) Загальний аналіз сечі.
- d) Дослідження калу на яйця гельмінтів.
- e) Копрологічне дослідження.

64. У хлопчика 4 років самопочуття погане, виражена слабкість, рухова активність знижена, шкірні покриви бліді. На шкірі і видимих слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, розташовані асиметрично, безболісні, тахікардія, Ps – 100/ хв., АТ – 80/40 мм рт.ст. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини.

- a) Зниження рівня тромбоцитів.
- b) Зниження рівня гемоглобіну.
- c) Запалення дрібних судин.
- d) Дефіцит ІХ фактора.
- e) Підвищена швидкість осідання еритроцитів.

65. При огляді в дитини 4 років спостерігаються: шкіра обличчя бліда з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з дистанційними свистячими хрипами. Хрипи чути на відстані. Грудна клітка здута. Вкажіть захворювання, для якого є характерними пріоритетні проблеми пацієнта.

- a) Бронхіальна астма.
- b) Крупозна пневмонія.
- c) Гострий бронхіт.
- d) Стафілококова пневмонія.
- e) Хронічний бронхіт .

66. У дівчинки 12-ти років спостерігаються: порушення сну, головний біль, біль у попереку, болісні часті сечовиділення малими порціями. Симптом Пастернацького – позитивний справа, відсутні набряки. При складанні плану сестринського догляду медична сестра приділяє увагу дієті. Вкажіть дієту, рекомендовану даній дитині.

- a) № 5.
- b) № 1.
- c) № 9.
- d) № 10.
- e) № 15.

67. Дитині 3 місяці, знаходиться на штучному вигодовуванні. Після вживання вперше 60 мл виноградного соку через 20 хв. у дитини спостерігалися: блювання, рідкі неоднорідні випорожнення з невеликою кількістю слизу та неперетравленою їжею з білими грудочками, 7 разів протягом доби. Для обстеження призначено копрологічне дослідження. Вкажіть лабораторію, до якої необхідно відправити дане обстеження

- a) Клінічна.
- b) Біохімічна.
- c) Бактеріологічна.
- d) Імунологічна.
- e) Вірусологічна.

68. У хлопчика 4 років після споживання незрілих абрикос стан погіршився. При обстеження дитини спостерігаються: слабкість, млявість, головний біль, відчуття важкості в надчеревній ямці, нудота,

блювання, біль у животі. Випорожнення нестійкі. Вкажіть першочергову дію медсестри.

- a) Промити шлунок.
- b) Дати тепле пиття.
- c) Здійснити санацію ротової порожнини.
- d) Призначити лікувальну дієту.
- e) Дати знеболювальні препарати.

69. Хлопчику, який страждає на часті носові кровотечі встановлено діагноз – гемофілія. Мама й тато дитини практично здорові. Вкажіть причину виникнення даного захворювання?

- a) Спадковість.
- b) Харчові алергени.
- c) Вакцинація.
- d) Низька інсоляція.
- e) Перегрівання .

70. Дитина 7 місяців, знаходиться на обліку у сімейного лікаря з приводу залізодефіцитної анемії. Який продукт прикорму з підвищеним вмістом заліза ви порекомендуєте мамі ввести?

- a) М'ясний фарш.
- b) Сир.
- c) Кефір.
- d) Манна каша.
- e) Риба.

71. На амбулаторному прийомі у сімейного лікаря дитина 4 місяців, яка знаходиться на штучному вигодовуванні та з 2 місяців отримує суміш „ Малиш ”. При огляді на щоках виявлено гіперемію, лущення. Яку суміш, на вашу думку необхідно порекомендувати мамі замість попередньої?

- a) НАН – гіпоалергенний.
- b) Деталакт.
- c) Нутролон.
- d) Нестожен.
- e) Малютка .

72. У дитини 1 року раптово виникла короткочасна зупинка дихання, гучний крик “півнячий крик”. При огляді шкіра ціанотична, вкрита липким потом, дитина злякана, має прояви рахіту. Якої невідкладної допомоги потребує дитина?

- a) Надавити на корінь язика.
- b) Подразнити шкіру вздовж хребта.
- c) Подразнити підшву ударами по п’ятці.
- d) Бити по сідницях.
- e) Стискувати грудну клітку.

73. При обстеженні дитини 2 років, хворої залізодефіцитною анемією, медсестра виявить скаргу на:

- a) Спотворений апетит.
- b) Підвищений апетит.
- c) Спрагу.
- d) Пронос.
- e) Нічне нетримання сечі .

74. Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання виявить медсестра під час обстеження?

- a) Експіраторну задишку.
- b) Інспіраторну задишку.
- c) Тахіпное.
- d) Брадіпное.
- e) Апноє .

75. З яким збудником найчастіше пов’язують виникнення хронічного гастриту?

- a) Гелікобактером пілорі.
- b) Стафілококом.
- c) Стрептококом.
- d) Протеем.
- e) Сальмонелою .

76. Дитина 6 років перебуває на лікуванні в стаціонарі з приводу гострої пневмонії. Яку проблему визначить медсестра як провідну?

- a) Кашель.

- b) Нежить.
- c) Зниження апетиту.
- d) Порушення сну.
- e) Підвищену пітливість .

77. Визначте ферментативні препарати, які використовують у разі розладів травлення

- a) Панкреатин.
- b) Ретаболіл.
- c) Пиридоксин.
- d) Ретинол.
- e) Карсіл.

78. Діагностуйте вид коми, якщо дитина знепритомніла, риси обличчя загострені, шкірні покриви і слизові оболонки сухі, дихання глибоке шумне, відчувається запах ацетону

- a) Гіперглікемічна.
- b) Гіпоглікемічна.
- c) Печінкова.
- d) Азотемічна.
- e) Уремічна.

79. У дитини, яка перехворіла на аскаридоз, спостерігаються незначний біль у животі, послаблення стільця, інколи нудота. Для відновлення нормального біоценозу кишківника важливо застосувати:

- a) Біфідобактерин.
- b) Пентоксил.
- c) Тіамін.
- d) Панкреатин.
- e) Карсіл .

80. Дитині віком 1 місяць з метою профілактики рахіту призначають:

- a) Аквадетрім.
- b) Аскорутін.
- c) Фестал.
- d) Пантенол.
- e) Фарінгосепт.

81. Немовля народилося від п'ятої вагітності (попередні переривалися у першому триместрі), що перебігала з токсикозом, анемією. Мати працює на хімічному комбінаті, що виробляє хімічні речовини. У дитини визначається вроджена вада серця. Яка імовірна причина вродженої вади?

- a) Вплив професійної шкідливості.
- b) Пізній токсикоз вагітності.
- c) Анемія вагітних.
- d) Ранній токсикоз.
- e) Хромосомні аномалії.

82. Ви медсестра сільської дільниці. Вас викликали до дівчинки 7 років з $t 39.5\text{ C}$, ознобом, пітливістю, болями у животі і при сечовипусканні, сеча мутна. Про що впершу чергу виподумаєте?

- a) Пієлонефрит.
- b) Ниркова колька.
- c) Цистит.
- d) Гломерулонефрит.
- e) Гостра ниркова недостатність.

83. Дитині 12 років, захворіла гостро $t 38,0\text{C}$, слабкість, біль у животі та попереку, дизурічні прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну ангіну. З якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини?

- a) Загальний аналіз сечі.
- b) Аналіз сечі по Нечипоренко.
- c) Аналіз сечі по Земницькому.
- d) Посіву сечі на стерильність.
- e) Аналізу сечі на цукор.

84. Дитина 10 років пониженого живлення, скаржить на періодичний гострий біль в епігастральній ділянці та справа від пупка частіше натще або після їжі, печію, відрижку кислим. Дані проблеми характерні для:

- a) Гастриту.
- b) Холециститу.
- c) Панкреатиту.
- d) Дискінезії жовчовивідних шляхів.

е) Хронічний гастрит .

85. Здійснюючи I етап медсестринського процесу, медична сестра виявила у 5-ти річного хлопчика блідість шкіри та слизових оболонок, тріщини у куточках рота. Лікар поставив діагноз –залізодефіцитна анемія. Які з перерахованих причин могли спровокувати дану патологію?

- а) Глистяна інвазія.
- б) Надмірне фізичне навантаження.
- в) Часті респіраторні захворювання.
- г) Довготривале отримання антигістамінних препаратів.
- е) Овочеve харчування.

86. У якому віці поява вторинних статевих ознак вважається передчасною?

- а) До 8 років.
- б) До 9 років.
- в) До 11-12 років.
- г) До 13-14 років.
- е) До 10 років.

87. Дитина 8 років з вродженою вадою серця знаходиться на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні в зв'язку з погіршенням стану і появою набряків. Які дії медсестри будуть першочерговими при даній патології?

- а) Проводити облік випитої і виділеної рідини.
- б) Підрахувати частоту серцевих скорочень.
- в) Виміряти температуру тіла.
- г) Організувати настільні ігри.
- е) Підрахувати частоту дихання.

88. Медична сестра відвідала на дому дитину 4-х місяців. Мама поскаржилася на блювання дитини неперетравленою їжею; випорожнення рідкі, зеленуваті, з білими грудочками, до 6-8 разів на добу. Об'єктивно: температура тіла 36,6 С, язик сухий з білим нальотом. Два дні тому мама самотійно ввела дитині перший прикорм. Про яке захворювання слід думати?

- a) Проста диспепсія.
- b) Кишковий токсикоз.
- c) Токсична диспепсія.
- d) Гіпокальціємічний синдром.
- e) Кишкова інфекція

89. Мати звернулась до медичної сестри зі скаргами на те, що її 3-місячний малюк має недостатній зріст. Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці – 52 см. Об'єктивно: дитина млява, сонлива, пастозність обличчя, язик трохи висунутий, пернісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. Яку патологію запідозрить медична сестра?

- a) Гіпотиреоз.
- b) Хвороба Дауна.
- c) Рахіт.
- d) Гіпертиреоз.
- e) Лімфатико-гіпопластичний діатез.

90. Дитині 7 днів. Здійснюючи патронаж, медична сестра виявила, що під час крику у дитини з'являється ціаноз носогубного трикутника. Під час годування дитина робить часті перерви. Об'єктивно: температура тіла – 36,7С, ЧСС – 140\хв, ЧДР – 80\хв. Зі слів матері, на 12-му тижні вагітності вона переохворіла на ГРВІ. Яке дослідження першочергово необхідно провести дитині для встановлення діагнозу?

- a) Рентгенологічне дослідження.
- b) Електрокардіографія.
- c) Загальний аналіз крові.
- d) Загальний аналіз сечі.
- e) Біохімічний аналіз крові.

91. Хлопчик 15-ти років з підозрою на хронічний гастрит надійшов до дитячої лікарні для проведення комплексного обстеження. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу, медсестри повинна підготувати його до проведення:

- a) Фіброгастроскопії з біопсією.
- b) Дуоденального зондування.
- c) Забору калу на яйця гельмінтів.
- d) Шлункового зондування.

е) Забору калу на копрограму.

92. У дитини 5-ти місяців на тім'яній ділянці голови з'явилися себорейні лусочки, на шкірі щік явища молочного струпа. При реалізації плану медсестринських втручань медсестра порадить матері:

- а) Змащувати елементи стерильною олією за 30 хвилин до гігієнічної ванни.
- б) Змащувати лусочки декілька разів на добу діамантовим зеленим.
- в) Включити до раціону дитини ягідні, морквяні, цитрусові соки.
- г) Регулярно проводити дитині масаж, гімнастику.
- е) Давати дитині за призначенням лікаря препарати заліза.

93. У дворічної дитини гостро розвинувся набряк по всьому тулубу. АТ – 120-80 мм.рт.ст. Діурез знижений. Виражена протеїнурія, мікрогематурія. Для якого захворювання характерні такі проблеми?

- а) Гострий гломерулонефрит, нефротична форма.
- б) Хронічна ниркова недостатність.
- в) Пієлонефрит.
- г) Ізольований сечовий синдром.
- е) Гострий панкреатит.

94. Для проведення очисної клізми дитині віком 2 місяці медична сестра готує кип'ячену воду температурою:

- а) 28-30 С.
- б) 38-40 С.
- в) 12-14 С.
- г) 37-38 С.
- е) 36-37 С.

95. Сімейна медична сестра спостерігає за дитиною з гіпотрофією I ступеня в домашніх умовах. На який показник повинна звернути увагу першочергово?

- а) Маса тіла дитини.
- б) Форма грудної клітки.
- в) Зріст дитини.
- г) Шкірні покриви.
- е) Форма голови.

96. Дитина 4-х років захворіла раптово : з'явився гавкаючий кашель, свистячий вдих, який чути на відстані. Температура тіла субфебрильна. При аускультатії легень – сухі провідні хрипи. Про який стан можна думати?

- a) Стенозуючий ларинготрахеїт.
- b) Гострий назофарингіт.
- c) Гостра пневмонія.
- d) Гострий обструктивний бронхіт.
- e) Гострий бронхіт.

97. Дитині, що народилася на 36 тижні вагітності з масою тіла 2100 г, специфічну профілактику рахіту слід почати з такого віку:

- a) 2 тижні.
- b) 2 місяці.
- c) 1,5 місяці.
- d) 1 місяць.
- e) 1 тиждень

98. У дитини 7 місяців, яка перебуває на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко), спостерігається пітниця, попрілості, “географічний” язик, кон'юнктивіт. Діагностовано ексудативно-катаральний діатез. Які примочки Ви порекомендуєте у разі загострення даного діатезу?

- a) З відваром кори дуба, кропиви.
- b) З гідрокарбонатом натрію.
- c) З розчином антибіотика.
- d) З вітамінним компонентом.
- e) З відваром липового цвіту.

99. Дитина 3 років захворіла декілька годин тому. З'явилися загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38,2°C, біль у надчеревній ділянці, нудота, блювання. Випорожнення надмірні, пінисті, містять велику кількість слизу, зелені. Яку з проблем слід очікувати протягом перших 3-ох діб:

- a) Токсикоз з ексикозом.
- b) Інфекційно – токсичний шок.
- c) Порушення функції підшлункової залози.
- d) Анемія.

е) Гостра ниркова недостатність.

100. У дитини, 2міс., спостерігається білий наліт на слизовій оболонці ротової порожнини, зокрема на язиці, нагадує молоко, що зсілося. Виберіть препарат етіотропної терапії.

- а) Ністатин.
- б) Вермокс.
- в) Ревіт.
- г) Цефазолін.
- е) Пеніцилін.

101. У дівчинки 9 років дратівливість, зміна почерку, порушення ходи. За місяць до цього перенесла ангіну. При огляді м'язова гіпотонія, мимовільні скорочення мимічної мускулатури і пальців рук. Про який прояв ревматичного ураження можна подумати?

- а) Мала хорія.
- б) Ревмокардит.
- в) Ревматичний артрит.
- г) Аулярна висипка.

102. У стаціонарі дитина 10-ти років з приводу рецидива ревматизму. Яка потенційна проблема може виникнути у дитини після кількох атак ревматизму?

- а) Набута вада серця.
- б) Мала хорія.
- в) Ревматичний поліартрит.
- г) Аулярна еритема.
- е) Ревматичний полісерозит.

103. У дитини 5-ти місячного віку відставання в масі тіла складає 25%. Підшкірно жирова клітковина майже зникла на животі, кінцівках. Це відповідає:

- а) Паратрофії.
- б) Гіпотрофії II ступеня.
- в) Гіпотрофії I ступеня.
- г) Гіпотрофії III ступеня.
- е) Норма.

104. У хлопчика 3-х років, який страждає на гіпокальціємічний синдром на фоні довготривалого плачу з'явився ларингоспазм. Чим можна допомогти дитині:

- a) Натиснути на корінь язика.
- b) Зробити ніжну ванну.
- c) Ввести анальгін.
- d) Провести інгаляцію.
- e) Провести відволікаючу терапію.

105. У хворого 15 років після перенесеного грипу з'явилися загальна слабкість, кровотечі з носа та ясен, біль у горлі під час ковтання, температура тіла 39 С. У зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований. Запідозрений гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне дослідження для даного захворювання.

- a) Дослідження пунктату кісткового мозку.
- b) Загальний аналіз сечі.
- c) Визначення рівня заліза в крові.
- d) Визначення білірубіну в крові.
- e) Загальний аналіз крові.

106. У дитини, що знаходиться на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми, виник астматичний стан. Який з препаратів застосовують для надання першої допомоги?

- a) 2,4% розчин еуфіліну.
- b) Реополіглюкін.
- c) 50% розчин анальгіну.
- d) 0,5% розчин седуксену.
- e) Ампіцилін.

107. У дитини 3-х років на другий день хвороби загальний стан погіршився. Дитина стала неспокійною, дихання шумне, допоміжні м'язи грудної клітки беруть участь у акті дихання. «Гавкаючий» кашель, голос сиплий. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

- a) Зробити лужну інгаляцію.
- b) Накласти зігріваючий компрес на грудну клітку.
- c) Надати горизонтальне положення.

- d) Зрошувати ротову порожнину розчином фурациліну.
- e) Закрапати нас розчином «Називін».

108. Дитина 4-хмісяців не витримує перерви між годуваннями.

Об'єктивно: шкіра бліда, підшкірно жирова клітковина відсутня на животі, маса тіла зменшена на 12% від норми. Клінічна картина характерна для:

- a) Гіпотрофії I ступеня.
- b) Токсичної диспепсії.
- c) Паратрофії.
- d) Гіпотрофії III ступеня.
- e) Гіпотрофії II ступеня.

109. До стаціонару поступила дитина зі скаргами на біль у кістках, суглобах. Об'єктивно: стан дитини вадкий, шкіра бліда, крововиливи, печінка та селезінка збільшені, пальпуються всі групи периферичних лімфатичних вузлів. В аналізі крові – нормохромна анеміятромбоцитопенія;улейкоцитарній формулі – баластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

- a) Лейкоз.
- b) Тромбоцитопенія.
- c) Анемія.
- d) Гемофілія.
- e) Геморагічний васкуліт.

110. Під час лікування активної фази ревматизму у дітей використовують групу не стероїдних протизапальних препаратів, таких як:

- a) Вольтарен, ортофен, індометацин.
- b) Супрастин, діазолін, тавегіл.
- c) Рибоксин, глютамінова кислота.
- d) Делагіл, плаквеніл.
- e) Контрікал, гордокс.

111. В дитяче відділення поступив хлопчик з клінічно вираженими симптомами ревматичного кардиту та поліартриту. Яку основну умову у догляді за дитиною, окрім інтенсивної протизапальної терапії, повинна забезпечити медична сестра?

- a) Суворий ліжковий режим.
- b) ЛФК з перших днів надходження до стаціонару.
- c) Палатний режим.
- d) Ліжковий режим.
- e) Масаж кінцівок.

112. Дитині 1 рік 8 місяців. Млява, бліда, апетит погіршений, шкіра суха. У крові: ер. -3,1 x 10¹²/л, Нв 95г/л. В анамнезі: штучне вигодовування, несвоєчасне введення прикорму, порушення режиму. Ці проблеми вказують на наявність у дитини такого захворювання:

- a) Залізодефіцитна анемія.
- b) Геміфілія.
- c) Тромбоцитопенічна пурпура.
- d) Лейкоз.
- e) Геморагічний васкуліт.

113. На консультативний прийом в дитячу поліклініку прийшла мати з дитиною 1 місяця життя. Дільничним педіатром був встановлений діагноз: попрілості II ступеня. Що буде спостерігатися у дитини в ділянці пахвових складок?

- a) Гіперемія, окремі ерозії.
- b) Окремі ерозії.
- c) Екзема.
- d) Гіперемія, злиття ерозій.
- e) Гіперемія.

114. У дитини 3-х місяців у природних складках виникли попрілості, в тім'яній ділянці голови –себореїні лусочки. Симптоми вказують на:

- a) Ексудативно-катаральний діатез.
- b) Нервово-артритичний діатез.
- c) Гіпокальціємічний синдром.
- d) Лімфатико-гіпопластичний діатез.
- e) Гіповітаміноз.

115. Хлопчик 10-ти років страждає на цукровий діабет. Через 30 хвилин після введення інсуліну з'явилися такі проблеми: тремор, пітливість, втрата свідомості, судоми. Визначте, для якого стану характерні такі проблеми:

- a) Гіпоглікемічна кома.
- b) Гіперглікемічна кома.
- c) Уремічна кома.
- d) Гіпоксична кома.
- e) Мозкова кома.

116. Дівчинка 14-ти років скаржиться на неспокій, плаксивість, пітливість, підвищений апетит, схуднення. Об'єктивно: температура тіла 37,5 С, вологі долоні, тремтіння повік і язика, тахікардія, екзофтальм, блиск очей. Про яке захворювання йдеться?

- a) Дифузний токсичний зоб.
- b) Гіпотиреоз.
- c) Гіпофізарний нанізм.
- d) Вегето-судинна дисфункція.
- e) Цукровий діабет.

117. До шкільної медсестри звернулась мати хлопчика 11-ти років з проханням дати рекомендації щодо занять її сина фізкультурою. Нарікає, що хлопчик переважно після уроків сидить вдома за комп'ютером і не хоче відвідувати уроки фізкультури. При фізичному обстеженні школяра виявлено слабкий розвиток м'язів, незначну деформацію хребта. Який медсестринський діагноз відповідає такому стану?

- a) Гіподинамія.
- b) Непереносимість діяльності.
- c) Соціальна ізоляція.
- d) Порушена здатність до переміщення.
- e) Втома.

118. Дитина 6-ти місяців знаходиться на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення температури тіла до 37,5 С, блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 разів на добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему?

- a) Ексикоз.
- b) Блювання.
- c) Судоми.
- d) Гіпертермія.
- e) Діарея.

119. У школяра 6-го класу, який страждає на цукровий діабет, на п'ятому уроці розвинулась слабкість, запаморочення, дитина вкрилась холодним потом, зблідла. Який стан розвинувся у дитини?

- a) Гіпоглікемічна кома.
- b) Печінкова кома.
- c) Колапс.
- d) Гіперглікемічна кома.
- e) Непритомність.

120. У дитини 8-ми місяців збільшені лобні та тім'яні горби, на грудній клітці є симптом «чоток»; дитина не сідає. Такий стан вказує на:

- a) Підгострий рахіт.
- b) Гострий рахіт.
- c) Гіпотрофію.
- d) Гіпервітаміноз
- e) Спазмофілію.