

## Тести до підсумкового модульного контролю №4

### з «Медсестринства в педіатрії» 4 курс 2024

Доцент Самойленко І.Г.

1. У дитини виникла носова кровотеча. На дошпитальному етапі для зупинки кровотечі необхідно застосувати:

- a) Холод на перенісся;
- b) Холод на підборіддя;
- c) Тепло на перенісся;
- d) Холод на п'яти;
- e) Холод на грудиноу.

2. Дитині 5 років, при взятті крові із пальця зомліла. Якого положення дитині повинна надати медична сестра:

- a) Лежачи, голова нижче тулуба;
- b) Лежачи, голова на рівні тулуба;
- c) Лежачи, голова вище тулуба;
- d) Сидячи, голова закинута назад;
- e) Сидячи, голова нахилена вперед.

3. Бригада швидкої допомоги виїхала на виклик до дитини 7 років.

Об'єктивно: дитина без свідомості, дихання та серцебиття відсутні, шкіра ціанотична. Які заходи в першу чергу необхідно провести:

- a) Покласти на тверду рівну поверхню;
- b) Провести штучну вентиляцію легень;
- c) Звільнити дихальні шляхи;
- d) Провести непрямий масаж серця;
- e) Ввести лікарські препарати.

4. У дитини 3 років виникла зупинка дихання. З якою частотою (кількість вдихів за хвилину) необхідно проводити штучне дихання?

- a) 20-25;
- b) 80-100;
- c) 100-120;
- d) 10-15;
- e) 25-30.

5. Дитина віком 11 місяців поступила у відділення інтенсивної терапії з вираженим зневодненням, акроціанозом. Який інфузійний розчин можна вводити до з'ясування причини та встановлення типу зневоднення?

- a) 0,9% розчин натрію хлориду;
- b) 10% розчин глюкози;
- c) 5% розчин глюкози;
- d) 5% натрію хлориду;
- e) 3% розчин калію хлориду.

6. Дитина випила 9% розчин оцту. Через кілька хвилин виникло відчуття важкості в епігастрії, нудота, блювання, біль у животі. Який розчин доцільно використати для промивання шлунка у даному випадку?

- a) 1% розчин гідрокарбонату натрію;
- b) 0,9% розчин хлориду натрію;
- c) Кип'ячену воду;
- d) 10% розчин хлориду натрію;
- e) 5% розчин перманганату калію.

7. Дитині 12 міс, знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ. Увечері з'явився неспокій, сухий нав'язливий "гавкаючий" кашель, охриплість голосу, рясні слизистосерозні виділення з носа. Об'єктивно: шкіра чиста, слизові гіперемійовані  $t^{\circ}$  тіла  $38,5^{\circ}\text{C}$ . Першочергові дії медичної сестри:

- a) Заспокоїти дитину, узяти на руки;
- b) Протерти шкіру напівспиртовим розчином;
- c) Поставити гірчичники;
- d) Зробити масаж грудної клітини;
- e) Ввести антибіотики.

8. Дитина 12 місяців хвора на рахіт. Під час гри раптово з'явилися: витрішкуватість, зляк наобличчі, ціаноз навколо рота і носа зупинилося дихання. Через декілька секунд з'явився гучний вдих – "півнячий крик". Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати дитині?

- a) Негайно надавити на корінь язика і покропити обличчя холодною водою;
- b) Госпіталізувати пацієнта;
- c) Призначити вітамін Дз;
- d) Ввести проти судомні препарати;
- e) Застосувати гормональні препарати.

9. Дитина 10 років страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції інсуліну дитина не поїла. На другому уроці раптово з'явилося відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги дитині на догоспітальному етапі?

- a) Дати дитині цукерку, солодкий чай;
- b) Госпіталізувати;
- c) Ввести п/шкірно 0,1% розчин адреналіну;
- d) Ввести в/венно преднізолон;
- e) Ввести в/м'язово 25% розчин магнію сульфату.

10. На яку глибину необхідно здійснювати натискування грудної клітки при проведенні непрямого масажу серця дитині 2 років?

- a) На 1-2 см;
- b) До 1 см;
- c) На 3-4 см;
- d) На 5-6 см;
- e) На 7-8 см.

11. Дитина трьох років. Після внутрішньом'язового введення пеніциліну з'явилась слабкість, нудота, блідість, холодний піт. Які невідкладні заходи ви проведете в першу чергу?

- a) Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну;
- b) Парентерально ввести еуфілін;
- c) Промити шлунок;
- d) Призначити церукал;
- e) Дати понюхати нашатирний спирт.

12. У дівчинки 14 років, що хворіє на цукровий діабет, у школі на контрольній роботі з'явилась пітливість, підвищений м'язовий тонус, загальний тремор, слабкий пульс, зниження АТ. Які дії медсестри є першочерговими у даному випадку?

- a) Дати випити солодкий чай;
- b) Провести оксигенотерапію;
- c) Застосувати серцеві глікозиди;
- d) Ввести 0,5% глюкагон 0,1 мл;
- e) Ввести 0,5% розчин седуксену 1 мг/кг.

13. Дитині 9 років з діагнозом: ГРВІ. Гіпертермічний синдром, була введена літична суміш. Через 40 хвилин дитина різко встала з ліжка і впала. Об'єктивно:  $t - 35,2^{\circ}\text{C}$ , шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ - 70/40 мм рт.ст. Оцінити стан дитини та ефективність проведеного догляду.

- a) Гостра судинна недостатність, колапс; порушення ліжкового режиму;
- b) Гостра судинна недостатність, зомління; відсутність фізичних методів охолодження;
- c) Анафілактичний шок; швидке введення препаратів;
- d) Медикаментозне отруєння; порушення ліжкового режиму;
- e) Гіпоглікемічна кома; порушення дієти.

14. Засобом першого вибору в стратегії лікування судомогого синдрому у дітей являється:

- a) Седуксен;
- b) Люмінал;
- c) Дімедрол;
- d) Хлористий кальцій;
- e) Сульфат магнію.

15. У хворої дитини 7-ми років медсестра виявила такі проблеми: різке зниження температури до  $35,2^{\circ}\text{C}$ , слабкість, холодний піт, ниткоподібний пульс. Дихання часте, поверхнєве. Для якого стану характерні дані проблеми?

- a) Колапсу.
- b) Гострої дихальної недостатності.
- c) Набряку легенів.
- d) Гіпоглікемічної коми.
- e) Непритомності.

16. Під час нападу клоніко-тонічних судом медсестра повернула дитину на бік та запобігла прикушування язика, губ, ушкодження зубів. Який предмет розташувала медсестра між корінними зубами?

- a) Циліндр одноразового шприца.
- b) Гумовий балончик.
- c) Стерильний пінцет.
- d) Стерильну ватну кульку.
- e) Стерильну марлеву серветку.

17. При внутрішньом'язовому введенні пеніциліну у дитини 8-ти років з'явилися свербіння шкіри і почуття жару в грудях. Медична сестра закінчила вводити пеніцилін, викликала лікаря, поклала дитину на кушетку, приклала міхур з льодом до місця ін'єкції, налагодила оксигенотерапію. Які дії медсестри були помилковими?

- a) Продовження введення пеніциліну.
- b) Розташування дитини в горизонтальному положенні.
- c) Прикладання холоду на місце ін'єкції.
- d) Проведення оксигенотерапії.
- e) Звертання за допомогою лікаря.

18. Під час прогулянки на дитячому майданчику 3-х річну дівчинку вжалила оса. Які заходи треба провести в якості долікарської допомоги?

- a) Прикласти холод на місце укусу.
- b) Прикласти грілку на місце укусу.
- c) Накласти гірчичник на місце укусу.
- d) Розтерти місце укусу.
- e) Чекати огляду лікаря.

19. Дитина 8-и років була госпіталізована до реанімаційного відділення з діагнозом “Гостра лівошлуночкова недостатність”. Яке положення треба надати цій дитині в ліжку?

- a) Напівлежаче з підвищеним на  $30^\circ$  головним кінцем.
- b) Горизонтальне з піднятим ніжним кінцем.
- c) Горизонтальне з поверненою набік головою.
- d) Колінно – ліктьове.
- e) На лівому боці з приведеними до живота ногами.

25. Після проведення реанімаційних заходів дитині, народженій із асфіксією, протягом 10 хвилин було визначено звуження зіниць, порожевіння шкіри, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?

- a) Продовжувати комплекс реанімаційних заходів.
- b) Припинити реанімацію повністю.
- c) Перевести дитину у відділення інтенсивної терапії новонароджених.
- d) Забезпечити контакт з матір'ю “шкіра до шкіри” .
- e) Спостерігати за станом життєвих функцій.

26. Ви – медсестра табору відпочинку дітей дошкільного віку, який розташований у лісі. Під час прогулянки дитину 5 років укусила оса в ділянці обличчя. Через 30 хвилин дитина почала скаржитись на головний біль, запаморочення, з'явилась задишка. Яку невідкладну допомогу ви повинні надати дитині?

- a) Застосувати холод на місце укусу та обколоти його 0,1% розчином адреналіну.
- b) Напоїти дитину солодким чаєм.
- c) Ввести в/м 25% розчин магнію сульфату.
- d) Ввести в/м 50% розчин анальгін.
- e) Викликати швидку медичну допомогу і госпіталізувати дитину до лікарні.

27. Дитина 2 років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена ІУ ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

- a) Трахеотомія.
- b) Подання зволоженого кисню.
- c) Відволікальна терапія.
- d) Антигістамінні засоби.
- e) Парові інгаляції.

28. Визначте препарат, який потрібно ввести дитині з ДВЗ-синдромом І стадії:

- a) Гепарин.
- b) Дицинон.
- c) Кальцію хлорид.
- d) Кальцію глюконат.
- e) Магнію сульфат.

29. Визначте наказ МОЗ України, згідно з яким надається невідкладна допомога дітям:

- a) №437.
- b) № 584.
- c) №30.
- d) №48.
- e) №152.

30. У дитини 2-х років діагностовано гіпертермічний синдром. Призначено введення літичної суміші. Що входить до складу літичної суміші?

- a) Анальгін, піпольфен, аміназин, новокаїн.
- b) Анальгін, преднізолон, аміназин, седуксен.
- c) Еуфілін, седуксен, новокаїн, преднізолон.
- d) Пеніцилін, інтерферон, лазікс, фестал.
- e) Індометацин, гідрокортизон, седуксен, платифілін.

31. Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углиб слід натискати на грудину?

- a) 1 – 1,5;
- b) 0,5 – 0,8;
- c) 2 – 3;
- d) 3 – 4;
- e) 4 – 5;

32. У дитини 3-х років діагностовано діабетичну кому. Ви плануєте медсестринські втручання. Із якого способу введення інсуліну розпочнеться невідкладна допомога при даній комі?

- a) Внутрішньовенно струминно.
- b) В/в краплинно.
- c) В/м.
- d) П/ш.
- e) В/ш.

33. У хлопчика 5-ти років захворювання почалося раптово вночі: значно погіршився загальний стан, дитина стала неспокійна, весь час плаче, температура тіла піднялася до 38оС. Дихання стало глибоким і частим, його чути на відстані; з'явився приступоподібний гавкаючий кашель. Як називається такий невідкладний стан?

- a) Гострий стенозуючий ларинготрахеїт.
- b) Астматичний стан.
- c) Гострий бронхіт.
- d) Пневмонія.
- e) Ангіна.

34. У разі гострого отруєння разова кількість рідини для промивання шлунку дитині віком одного року:

- a) 150 – 200 мл;

- b) 450 – 500 мл;
- c) 40 – 50 мл;
- d) 60 – 90 мл;
- e) 300 – 350 мл;

35. Ви надаєте невідкладну допомогу ВІЛ-інфікованій дитині. Які критичні ситуації створюють найбільший ризик передачі ВІЛ-інфекції?

- a) Зупинка дихання та проведення штучного дихання “рот до рота”.
- b) Зупинка дихання та проведення штучного дихання за допомогою мішка та маски.
- c) Проведення непрямого масажу серця.
- d) Пальпація живота.
- e) ЕКГ- контроль порушення серцевого ритму.

36. 5- місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

- a) 25 – 30;
- b) 10 – 15;
- c) 15 – 20;
- d) 80 – 100;
- e) 100 – 120;

37. Який препарат вводиться дитині в разі судом під час надання невідкладної допомоги?

- a) Сібазон.
- b) Лазикс.
- c) Еуфілін.
- d) Вікасол.
- e) Імуноглобулін.

38. У дитини віком 2 роки, яка хворіє на вогнищеву пневмонію, температура тіла 39,5°C. Який жарознижувальний препарат і в якій дозі повинна підготувати для введення медична сестра?

- a) 50% розчин анальгіну; 0,2мл;
- b) 0,5% розчин седуксену; 1мл;
- c) 2,4%розчин еуфіліну; 1 мл;
- d) 2% розчин папаверину гідрохлориду; 0,2 мл;
- e) 0,06% розчин корглікону; 0,2 мл;



39. Стан дитини 9 років раптово погіршився. При обстеженні: різка блідість шкіри з мармуровим відтінком, ціаноз губ, тіло вкрите холодним потом, дихання поверхневе, ЧДР – 25/хв., тони серця послаблені, ритмічні, Ps – 96/хв., ниткоподібний. Живіт м'який, безболісний. Вкажіть найінформативніше обстеження медичної сестри для визначення тяжкості ступеня даного невідкладного стану.

- a) Вимірювання артеріального тиску.
- b) Біохімічне дослідження крові.
- c) Магнітно-резонансна діагностика.
- d) Ультразвукове дослідження.
- e) Рентгенологічне дослідження.

40. У новонародженої дитини спостерігаються : ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе нерівномірне дихання, Ps – 56/хв., ритмічний, слабого наповнення, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців розташовані на нижній третині груднини дитини. Визначте найчастішу потенційну проблему пацієнта при потраплянні рук медпрацівника на мечоподібний відросток при здійсненні даної реанімації.

- a) Ушкодження печінки.
- b) Перелом ребер.
- c) Гематома грудної клітки.
- d) Відкритий пневмоторакс.
- e) Гостра емфізема легень.

41. У дівчинки 10 років, яка знаходиться на стаціонарному лікуванні, після тривалого порушення дієти (вживання цукерок), спостерігаються спрага, нудота, блювання, біль у животі, глибоке шумне дихання, посилення діурезу, відчуття запаху ацетону у видихуваному повітрі. Вкажіть найдоцільніші дії медсестри.

- a) Підготувати простий інсулін.
- b) Промити шлунок.
- c) Провести оксигенотерапію.
- d) Здійснити санацію ротової порожнини.
- e) Поставити очисну клізму.

42. У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт з'явилося посмикування м'язів обличчя з залученням інших груп м'язів. Про яке захворювання можна думати:

- a) Явна спазмофілія, еклампсія.
- b) Явна спазмофілія, ларингоспазм.
- c) Явна спазмофілія, карпопедальний спазм.
- d) Прихована спазмофілія, симптом Хвостека.
- e) Прихована спазмофілія, симптом Маслової.

43. Ви медсестра лабораторії, берете кров на загальний аналіз у дівчинки 5 років. Раптово дитина зблідла, поскаржилась на слабкість, знепритомніла. Яке сестринське втручання буде доцільним в цьому випадку?

- a) Вдихання подразнюючої рідини.
- b) Гірчичники на грудну клітку.
- c) Холодний компрес на чоло.
- d) Лікувальна ванна.
- e) Лікувальна фізкультура.

44. Після введення вакцини АКДП у хлопчика віком 1р. бміс. з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Дитині надано невідкладну допомогу. Який показник буде свідчити про покращення загального стану при оцінці результатів медсестринських втручань?

- a) Нормалізація АТ.
- b) Нормалізація температури тіла.
- c) Покращення апетиту.
- d) Нормалізація випорожнень.
- e) Нормалізація сну.

45. У дитини 3 років, хворої на ГРВІ, вночі раптово розпочався напад стенозуючого ларинготрахеїту. Яке незалежне втручання проведе медсестра при даному захворюванні?

- a) Гарячі ножні та ручні ванни.
- b) Постановку очисної клізми.
- c) Постановку газовідвідної трубки.
- d) Введення антигістамінних препаратів.
- e) Введення 5% розчину глюкози.

46. Дитина 10 років, хвора на цукровий діабет, отримавши інсулін, не поснідала. В класі раптово з'явились перші ознаки гіпоглікемічної коми. Яке втручання необхідно виконати медичній сестрі школи?

- a) Дати випити солодкий чай.
- b) Вивести на свіже повітря.

- c) Збризнути обличчя холодною водою.
- d) Піднести до носа кульку, змочену нашатирним спиртом.
- e) Подати зволожений кисень.

47. Під час забору крові хлопчик 12 років раптово зблід, вкрився холодним потом, втратив свідомість. Яке положення тіла повинна надати медсестра дитині?

- a) На спині з піднятими нижніми кінцівками.
- b) На животі.
- c) На боку.
- d) На спині з піднятою головою.
- e) Напівсидяче.

48. Дитина 6 років захворіла на грип. Яка скарга при медсестринському обстеженні буде першочерговою?

- a) Підвищення температури тіла до 39°C.
- b) Вологий кашель.
- c) Серозно-гнійні виділення з носа.
- d) Шум у вухах.
- e) Біль у животі.

49. У 5-річної дитини через 3-5 хвилин після укусу бджоли посилюється різкий біль в місці укусу, погіршився загальний стан, відчуття жару та не достатку повітря, головокружіння, шум у вухах. Виражена блідість шкіри акроціаноз, холодний липкий піт на тілі, різко знижений АТ. Який стан розвинувся у дитини?

- a) Анафілактичний шок.
- b) Гіперглікемічна кома.
- c) набряк Квінке.
- d) Гіпоглікемічна кома.
- e) Ацетонічний синдром.

50. Яких невідкладних заходів необхідно вжити в разі виникнення колапсу у дитини?

- a) Надати горизонтального положення з дещо піднятими кінцівками.
- b) Внутрішньом'язево ввести 50% розчин анальгіну.
- c) Надати дитині підвищене положення, піднявши головний кінець ліжка.
- d) Зробити промивання шлунку 1-2% розчином натрію бікарбонату.
- e) Внутрішньом'язево ввести 0,5% розчин седуксену.

51. Ви працюєте медичною сестрою в школі. До вас звернувся хлопчик 8 років зі скаргами на кровотечу з носа. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

- a) Посадити дитину з нахиленою головою вперед над лотком, ввести в носову.
- b) Порожнину турунду змочену 3% р-ном перексиду водню.
- c) Підрахунок ЧСС.
- d) Вимірювання АТ.
- e) Заспокоїти дитину.
- f) Надати горизонтального положення.

52. У дитини 7 місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом менінгококова інфекція. Які першочергові дії медсестри при наданні невідкладної допомоги?

- a) Профілактика западання язика.
- b) Міхур з льодом до голови.
- c) Подразнити корінь язика.
- d) Зігріти дитину грілками.
- e) ШВЛ, закритий масаж серця.

53. Дитині 1 рік. Захворіла раптово,  $t\ 39^{\circ}\text{C}$ , шкірні покриви рожеві, гарячі на дотик. Дитина млява, сонлива, носик закладений, сухий кашель. Медсестра використала фізичні методи охолодження для зниження  $t^{\circ}$ . Які ознаки вкажуть на ефективність медсестринських втручань?

- a) Зниження  $t^{\circ}$ .
- b) Брадикардія.
- c) Тахікардія.
- d) Тахипное.
- e) Зниження АТ.

54. У дитини 3-х років на другий день хвороби загальний стан погіршився. Дитина стала неспокійною, дихання шумне, допоміжні м'язи грудної клітки беруть участь у акті дихання. Кашель „ гавкаючий ”, голос хрипкий. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

- a) Зробити лужну інгаляцію.
- b) Надати горизонтальне положення.
- c) Накласти зігріваючий компрес на грудну клітину.
- d) Зрошування ротової порожнини розчином фурациліну.
- e) Закапати носик розчином Називін.

55. Медична сестра діагностувала у дитини клінічну смерть. Які заходи вона повинна провести в першу чергу при первинній серцево-легеневій реанімації?

- a) Відновити прохідність дихальних шляхів.
- b) Провести непрямий масаж серця.
- c) Ввести медикаменти.
- d) Провести дефібриляцію.
- e) Провести ШВЛ.

56. Дитина від доношеної вагітності народилась з оцінкою за шкалою Апгар 2 бали. Що потрібно негайно провести в пологовому залі, враховуючи стан дитини?

- a) Реанімаційні заходи.
- b) Зважування дитини.
- c) Щеплення проти гепатиту В.
- d) Обстеження на фенілкетонурію.
- e) Купання дитини.

57. Що вибере медсестра для надання невідкладної допомоги в разі стенозуючого ларинготрахеїту на догоспітальному етапі?

- a) Провести відволікаючу терапію.
- b) Провести очисну клізму.
- c) Провести промивання шлунку.
- d) Ввести 0,5% розчин сибазону.
- e) Ввести 50% розчин анальгіну.

58. Виберіть першочергові дії медичної сестри на догоспітальному етапі в разі анафілактичного шоку.

- a) Покласти на спину, голову повернути вбік. До ніг прикласти теплу грілку.
- b) Ввести 2,4% р-н еуфіліну.
- c) Прикласти холод до голови.
- d) Застосувати ШВЛ.
- e) Ввести 0,1% р-н адреналіну.

59. Дитину 9 років у дитячому таборі в праве передпліччя ужалила бджола. Має місце надмірний біль у місці ужалення, гіперемія та помірний набряк. Що у першу чергу повинна зробити медсестра щодо надання допомоги дитині?

- a) Видалити жало.
- b) Обколоти місце ужалення розчином адреналіну.
- c) Ввести внутрішньом'язово преднізолон.
- d) Накласти холодний компрес.
- e) Провести обробку шкіри діамантовим зеленим.

60. У дитини 5 місяців виникли проблеми: кволість,  $t$  38,5 $^{\circ}$ C, часті блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім'ячко запале. Для якого стану характерні ці симптоми?

- a) Синдром токсозу з ексикозом.
- b) Проста диспепсія.
- c) Пілоростеноз.
- d) Ентеробіоз.
- e) Гіперглікемічна кома.

61. Дитині 6 місяців. Знаходиться на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення температури тіла до 37,5 $^{\circ}$ C, блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 раз на добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему.

- a) Ексикоз.
- b) Блювання.
- c) Гіпертермія.
- d) Судоми.
- e) Діарея.

62. У школярки, 12 років, на уроці виник напад, який супроводжувався відчуттям страху, різкою блідістю, тахікардією, колючим болем в ділянці серця. Артеріальний тиск 110/70 мм рт.ст. Що доцільно зробити першочергово?

- a) Заспокоїти дитину, дати корвалол.
- b) Покласти дитину, ввести розчин кофеїну.
- c) Оксигенотерапія, ввести кордіамін.
- d) Укласти, ввести внутрішньовенно седуксен.
- e) Постільний режим, контроль артеріального тиску.

63. Дитина після народження не кричить, шкіра ціанотична, ЧСС- 80/хв., рефлекси знижені, тонус м'язів знижений. негайно розпочата серцево-легенева реанімація. Який показник свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?

- a) Відновлення дихання.

- b) Брадікардія.
- c) Розширення зіниць.
- d) Арефлексія.
- e) Відсутність пульсу на сонних артеріях.

64. У хворого внаслідок критичного зниження температури розвинувся колапс. Який з препаратів Ви введете хворому:

- a) Кордіамін.
- b) Еуфілін.
- c) Папаверин.
- d) Корглікон.
- e) Димедрол.

65. У дитини 10 років під час уроку почалась носова кровотеча. Яку невідкладну допомогу повинна медична сестра надати пацієнту?

- a) Ввести в носові ходи тампони з 3% розчином перекису водню.
- b) Закапати ніс 0,05% розчином нафтизину.
- c) Надати дитині горизонтальне положення.
- d) Ввести кордіамін п/ш.
- e) Ввести в носові ходи тампони змочені в розчині фурациліну 1:5000.

66. Дівчинка віком 12 років отримує інсулін. Вона порушила дієту і стан погіршився: шкіра бліда, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, посилений діурез. Надати невідкладну допомогу.

- a) Ввести інсулін.
- b) 40% р-н глюкози.
- c) 25% р-н магнію сульфату.
- d) 0,5% р-н седуксену.
- e) 20% р-н натрію оксибутирату.

67. У 6-ти річного хлопчика, який страждає цукровим діабетом через півгодини після введення інсуліну появився тремор, пітливість, неспокій, судоми. Чим допомогти дитині?

- a) Р-н 40% глюкози в/в.
- b) Р-н еуфіліну.
- c) Р-н седуксену.
- d) Р-н анальгіну.
- e) Р-н інсуліну.

68. У 3-х річного хлопчика, який страждає на гіпокальціємічний синдром на фоні довготривалого плачу появився ларінгоспазм. Чим можна допомогти дитині?

- a) Натиснути на корінь язика.
- b) Провести відволікаючу терапію.
- c) Зробити ніжну ванну.
- d) Провести інгаляцію.
- e) Ввести 50% р- анальгін.

69. П'ятирічний хлопчик під час забору крові з пальця зблід, покритися холодним потом, втратив свідомість. Яку невідкладну допомогу потрібно надати?

- a) Піднести ватну кульку змочену в нашатирному спирті під ніс дитині.
- b) Дати подихати зволеним киснем.
- c) Зробити содові інгаляції.
- d) Ввести серцеві глікозиди.
- e) Ввести 40% розчин глюкози в/в.

70. У дитини віком 3-х років вночі з'явився гавкаючий кашель, задишка. Спостерігається утруднення вдиху, блідість шкіри з синюшним відтінком, напруження шийних вен та м'язів. Якими будуть першочергові втручання медсестри?

- a) Паро-кисневі інгаляції.
- b) Мікстура від кашлю.
- c) Внутрішньовенно глюкоза з кокарбосерлазою.
- d) Ввести берешек та сальбутамол.
- e) Ввести літичну суміш.

71. В інфекційному відділенні знаходиться дитина з діагнозом ГРВІ. Гіпертермічний синдром. При обстеженні виявлено:  $t^{\circ} 39,4^{\circ}\text{C}$ , шкіра бліда, мармурова, кінцівки холодні на дотик. Який препарат потрібно ввести дитині за призначенням лікаря для зменшення спазму судин:

- a) Папаверину гідро хлорид.
- b) Седуксен.
- c) Супрастин.
- d) Магнію сульфат.
- e) Глюконат кальцію.



72. Дитині 18 міс., зроблено щеплення вакциною АКДП. Через 20 хв. стан різко погіршився. На шкірі тулуба з'явився висип дитина знепритомніла. Які лікарські препарати потрібно приготувати негайно?

- a) 0,1% розчин адреналіну.
- b) 1% розчин лаз іксу.
- c) 0,06% розчин корглікону.
- d) 2% розчин еуфіліну.
- e) 0,5% розчин седуксену.

73. У дитини, що перенесла внутрішньочерепну пологову травму, розпочалися судоми. Медична сестра для зняття судом повинна взяти першочергово:

- a) Седуксен.
- b) Анальгін.
- c) Димедрол.
- d) Парацетамол.
- e) Спазмалгон.

74. Дитина 5-ти років отруїлася грибами. Об'єктивно: свідомість не порушена. В долікарняних умовах штучно було викликано блювання. Медсестрі потрібно за призначенням лікаря провести промивання шлунку. Скільки рідини потрібно для промивання цієї маніпуляції?

- a) 3-5 літрів.
- b) 0,5 літра.
- c) 5-8 літрів.
- d) 1 літр.
- e) 1-2 літра

75. Медична сестра діагностувала у дитини клінічну смерть. Які заходи вона повинна провести в першу чергу при первинній серцево-легеневій реанімації?

- a) Відновити прохідність дихальних шляхів.
- b) Провести непрямий масаж серця.
- c) Ввести медикаменти.
- d) Провести дефібриляцію.
- e) Провести ШВЛ.

76. У 6-річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної алергії у вигляді кропив'янки та набряку Квінке. З яких препаратів слід розпочати інтенсивну терапію?

- a) Глюкокортикостероїди.
- b) Діуретики.
- c) Вітаміни.
- d) Седативні.
- e) Кальцію глюконат.

77. На уроці фізкультури хлопчик 9 років упав непритомним. Які ознаки найбільш імовірно свідчать про раптову зупинку серця?

- a) Широкі зіниці не реагують на світло.
- b) Часте дихання.
- c) Блідість шкіри.
- d) Слабкий пульс.
- e) Відсутність м'язового тону.

78. В приймальне відділення надійшла дитина 5 років з харчовим отруєнням. З чого слід почати надання невідкладної допомоги?

- a) Промивання шлунка.
- b) Введення жарознижуючих препаратів.
- c) Введення глюкозо-сольових розчинів в\в краплинно.
- d) Введення десенсибілізуючих препаратів.
- e) Постановка очисної клізми.

79. В 4-річної дитини на фоні ГРВІ розвинувся гіпертермічний синдром. Яку допомогу потрібно надати дитині:

- a) Ввести 50% розчин анальгін.
- b) Ввести 10% розчин глюкози.
- c) Ввести 500 тис. ОД бензилпеніциліну.
- d) Ввести 0,1% розчин адреналіну.
- e) Ввести 0,05% розчин седуксену.

80. У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат слід використати для надання дитині невідкладної допомоги?

- a) Преднізолон.
- b) Фуросемід.
- v) Кофеїн.

- г) Седуксен.
- д) Гепарин.

81. У дитини 7-ми років виникла раптова втрата контакту з оточуючими, блукаючий погляд, закидання голови назад, згинання верхніх кінцівок, витягування нижніх кінцівок. Для попередження прикушування язика під час судом медична сестра повинна:

- а) Ввести шпатель між корінними зубами.
- б) Захопити язик, вивести з рота.
- в) Обгорнути язик бинтом.
- г) Підшити язик до верхньої губи.
- д) Підшити язик до нижньої губи.

82. У 5-ти річного хлопчика розвинувся анафілактичний шок на введення антибіотика. Яким розчином потрібно обколоти місце введення алергену?

- а) 0,1% адреналіну гідро хлориду.
- б) 0,5% новокаїну.
- в) 10% глюконату кальцію.
- г) 50% анальгін.
- д) 1% димедролу.

83. У дитини 4-х місяців після введення вакцини АКДП виник анафілактичний шок. Дії медсестри на до госпітальному етапі?

- а) Місце введення обколоти 0,1% розчином адреналіну.
- б) Ввести ампіокс.
- в) Ввести амінокапронову кислоту.
- г) Ввести імуноглобулін.
- д) Ввести вікасол.

84. Дитині 5-ти років показано промивання шлунку в зв'язку з харчовим отруєнням. Яку разову порцію рідини повинна використати медична сестра?

- а) 500 мл.
- б) 900 мл.
- в) 950 мл.
- г) 800 мл.
- д) 1000 мл.

85. У 8-ми місячної дитини з'явився приступ ларингоспазму під час патронажу медичної сестри. Які дії повинна здійснити медична сестра?

- а) Натиснути на корінь язика.
- б) Зробити содово-трав'яні інгаляції.
- в) Зробити очисну клізму.
- г) Застосувати міхур з льодом.
- д) Ввести жарознижувальні препарати.

86. У дитини 3-х років на фоні високої температури тіла виникли судоми. Який препарат необхідно ввести дитині?

- а) 0,5% розчин седуксену.
- б) 5% розчин ефедрину.
- в) 0,9% фізіологічний розчин.
- г) 0,2% розчин адреналіну.
- д) Строфантин.

87. Хлопчик 10-ти років страждає на цукровий діабет. Через 30 хвилин після введення інсуліну з'явилися такі проблеми: тремор, пітливість, втрата свідомості, судоми. Визначте, для якого стану характерні такі проблеми:

- а) Гіпоглікемічна кома.
- б) Гіперглікемічна кома.
- в) Уремічна кома.
- г) Гіпоксична кома.
- д) Мозкова кома.